

予防接種を受けましょう

(定期予防接種のみ)



予防接種には、予防接種法によって定められた定期の予防接種とそれ以外の任意の予防接種があります。定期の予防接種は公費（無料）、任意接種は自費（有料）です。ワクチンで防げる病気からお子さんを守るためには、接種対象年齢の間にできるだけベストなタイミングで予防接種を受けることが重要です。

定期予防接種						
ワクチン名	種類	接種対象年齢	標準的な接種年齢	接種回数	接種間隔・その他	
B型肝炎	不活化	生後 1 歳未満	生後 2 ～ 8 か月	初回 2 回 追加 1 回	初回 27 日以上 追加：1 回目の接種終了後 139 日以上	
ロタウイルス <small>※いずれが同一の製剤で接種完了</small>	ロタリックス ロタテック	生 (経口)	生後 6 週～生後 24 週まで	2 回	27 日以上	
		生後 6 週～生後 32 週まで	初回接種は生後 2 か月～生後 14 週 6 日までに開始	3 回		
ヒブ	不活化	生後 2 か月～5 歳未満	初回接種開始は生後 2 か月～7 か月未満	生後 2 か月～7 か月未満に開始	初回 3 回 追加 1 回	初回：27 日（医師が認めるときは 20 日）以上（標準的には 27～56 日）の間隔で接種 2 回目、3 回目は生後 12 か月に至るまでの間。 追加：初回接種終了後 7 か月以上（標準的には 7～13 か月）
				生後 7 か月～12 か月未満に開始	初回 2 回 追加 1 回	
				生後 12 か月～5 歳未満に開始	1 回	
小児用肺炎球菌	不活化	生後 2 か月～5 歳未満	初回接種開始は生後 2 か月～7 か月未満 追加接種は生後 12 か月～15 か月未満	生後 2 か月～7 か月未満に開始	初回 3 回（生後 12 か月までに完了） 追加 1 回	初回：標準的には生後 12 か月までに 27 日以上 追加：初回終了後から 60 日以上かつ生後 12 か月に至った日以降
				生後 7 か月～12 か月未満に開始	初回 2 回（生後 24 か月までに完了） 追加 1 回	
				生後 12 か月～24 か月未満に開始	2 回	60 日以上
				生後 24 か月～5 歳未満に開始	1 回	—
四種混合	不活化	生後 3 か月～7 歳半未満	生後 3 ～ 12 か月	1 期初回：3 回	20 日以上 標準的には 20～56 日まで	
				1 期初回接種後 12～18 か月	1 期追加：1 回	1 期初回後 6 か月以上 （標準的には 1 期初回後 12 か月～18 か月の間）
二種混合	不活化	2 期 11 歳～13 歳未満	小学校 6 年	1 回	—	
結核 (BCG)	生	生後 1 歳未満	生後 5 ～ 8 か月未満	1 回	—	
麻しん風しん混合 (MR)	生	1 期 生後 12 か月～24 か月未満	生後 12 か月以降なるべく早く	1 回	—	
		2 期 5 歳以上 7 歳未満かつ小学校就学 1 年前～前日 (3/31) までの間	必ず年長児の内に接種	1 回		
水痘 (みずぼうそう)	生	生後 12 か月～36 か月未満	1 回目：生後 12～15 か月未満 2 回目：1 回目接種後 6～12 か月	2 回	2 回目：1 回目接種後 3 か月以上	
日本脳炎	不活化	生後 6 か月～7 歳半未満	3 歳	1 期初回：2 回	6 日以上（標準的には 6～28 日まで）	
			4 歳	1 期追加：1 回	1 期初回終了後 6 か月以上 （標準的には概ね 1 年）	
		2 期 9 歳～13 歳未満	小学校 4 年	1 回	—	
HPV (ヒトパピローマウイルス) <small>※同一ワクチンを 3 回続けて接種</small>	サーバリックス	不活化	小学校 6 年生から高校 1 年相当の女子	中学校 1 年生の間	3 回	2 回目：初回接種から 1 か月 3 回目：初回接種から 6 か月
	ガータシル					2 回目：初回接種から 2 か月 3 回目：初回接種から 6 か月

予防接種スケジュール

(定期予防接種のみ)

：定期予防接種の対象年齢

：標準的な接種年齢

ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期/思春期										
		1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上				
B型肝炎	不活化		①	②					③																	
ロタ	ロタリックス		①	②																						
	ロタテック		①	②	③					※原則として、ロタリックスまたはロタテックのいずれかが同一の製剤で接種を完了します。																
ヒブ	不活化		①	②	③																					
小児肺炎球菌	不活化		①	②	③																					
四種混合	ポリオ ジフテリア 百日咳 破傷風	不活化		①	②				③																	
二種混合	ジフテリア 破傷風	不活化																				11歳 ①	12歳			
BCG	生							①																		
麻しん風しん混合(MR)	生												①										②			
水痘	生												①										②			
日本脳炎	不活化																						① ②	③	④	9-12歳 (2期)
HPV (ヒトパピローマウイルス)	不活化																							小6	中1 ①②③	中2~高1

《異なるワクチンを接種する場合の接種間隔が変わりました》



※接種前に『予防接種と子どもの健康』を必ずお読みください。
 予約制の医療機関もありますので、あらかじめ電話で時間などを確認してください。
 具体的な接種スケジュールは、医療機関にてご相談ください。
 母子健康手帳を必ずお持ちください。予診票はすべて医療機関に用意してあります。

▲実施医療機関一覧は
 逗子市ホームページ (QRコード)
 にて確認ください